

Tabelle 8: Klinischer Aktivitätsindex (CAI) und Endoskopischer Index (EI) für die Colitis ulcerosa nach Rachmilewitz

	Werte
Anzahl der Stühle pro Woche < 18 = 0, 18 - 35 = 1, 36 - 60 = 2, > 60 = 3	
Blut im oder auf dem Stuhl kein = 0, wenig = 2, viel = 4	
Allgemeinbefindengut = 0, mäßig = 1, schlecht = 2, sehr schlecht = 3	
Bauchschmerzenkeine = 0, leicht = 1, mäßig = 2, stark = 3	
Fieber infolge der Kolitis 37 = 0, > 38 = 3	
Extraintestinale Manifestationen Iritis = 3, Erythema nodosum = 3, Arthritis = 3	
Laborbefunde BSG > 50 mm (1 h) = 1, > 100 mm = 2, Hb < 10,0 g % = 4	
Klinischer Aktivitätsindex (CAI), Summe =	
Lichtstreuung durch Granulation nein = 0, ja = 2	
Gefäßzeichnung normal = 0, verwaschen = 1, aufgehoben = 2	
Verletzbarkeit der Mukosa nein = 0, leicht = 2, stark = 4	
Beläge auf der Mukosa keine = 0, leicht = 2, deutlich = 4	
Endoskopischer Index (EI), Summe =	
Bewertung: Indexwerte > 4 sind vereinbar mit einem akuten Schub	
Goebell 2000	